

Information postopératoire: Femto-LASIK et Femto-CAIRS/Femto-ICRS

Jour postopératoire 1 et 2

- Veuillez suivre le protocole indiqué ci-dessous.
- Nous opérons généralement au début de la semaine et voyons nos patients chaque jour pendant 3 jours pour un contrôle rapide de l'épithélialisation et pour confirmer l'absence d'infection.
- Le seul risque significatif est l'acanthamoeba : éviter l'eau du robinet sur le visage, ne pas prendre de douche au-dessus du menton et ne pas se laver les cheveux. Faire bouillir l'eau du robinet n'aide pas, l'acanthamoeba peut survivre. Les patients peuvent utiliser de l'eau minérale plate du supermarché pour se laver le visage.

Lentille de contact pansement

- Au jour 1 (Femto-LASIK) ou au jour 2 (Femto-CAIRS/Femto-ICRS), nous retirons généralement la lentille de contact pansement.
- **Conseil pratique :** lors du retrait de la lentille de protection, l'épithélium peut être stressé et, dans les cas extrêmes, se déchirer. Il est préférable d'appliquer 2 à 3 gouttes de larmes artificielles jusqu'à ce que la lentille de contact bouge facilement lorsque le patient cligne. Tirez ensuite la paupière inférieure vers le bas et retirez délicatement la lentille de contact à l'aide d'un coton-tige.

Prendre une douche complète et se laver le visage avec de l'eau du robinet

- Généralement à partir du jour postopératoire 4





Jour postopératoire 3 jusqu'à 1 mois après l'intervention

- Commencer un traitement local avec des gouttes oculaires de fluorométholone (FML Liquifilm) deux fois par jour et adapter l'intensité ainsi que la classe des stéroïdes selon le degré de haze postopératoire.

Lentilles de contact spéciales

- L'adaptation de nouvelles lentilles de contact peut commencer quatre semaines après l'intervention.
- En général, la fluorométholone est arrêtée (Femto-LASIK) ou poursuivie pendant 4 semaines supplémentaires (Femto-CAIRS/Femto-ICRS).

Médicaments Femto-LASIK et Femto-CAIRS / Femto-ICRS

Jour de l'opération	Le jour de l'opération, ainsi que les jours 1 et 2 après l'opération													Du 3e jour à la fin de la 4e semaine
	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	
Heure 	X				X				X				X	Stop
Tobradex gouttes 	X				X				X				X	Stop
Optava gouttes 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Si besoin.
FML eyedrops 														08.00 et 18.00
Réserve														
Ibuprofen 400 mg comprimés	X												X	Stop
Paracetamol 500 mg comprimés	X												X	Stop

Une goutte par dose suffit. Répartissez l'administration des gouttes ophtalmiques tout au long de la journée et veuillez respecter un intervalle de 5 minutes entre l'administration de différentes gouttes.

Important : si vous venez à manquer de médicament avant la fin de la période de traitement indiquée ici, veuillez nous contacter immédiatement !